

Starane™ XL

OGRÄSMEDEL

Faroangivelser:

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön,

följ bruksanvisningen.

Skyddsangivelser:

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P501 Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.

Personlig skyddsutrustning:

Vid eller sprutväskan ska

Skyddshandskar och skyddsglasögon eller ansiktsskydd ska användas vid hantering av produkten.

Skyddshandskar ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutväska.

Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Första hjälpen:

P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

Se även produktens säkerhetsdatablad, avsnitt 4.

Särskilda miljörisker:

SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.

™ Trademarks of Corteva Agriscience
and its affiliated companies

Varning



0288235

2501

NETTOMÄNGD: 5 LITER e

Bekämpningsmedel klass 2L - Reg. nr 4686



Starane™ XL

OGRÄSMEDEL

GROUP 2 (B) HERBICIDE GROUP 4 (0) HERBICIDE

UFI: GTGO-DODK-Y00U-DXM4

Detta medel är prövat i svenska försök. Anvisningarna grundar sig på resultaten från dessa. Då användningen ligger utanför vår kontroll och vi ej kan förutse alla de omständigheter som kan påverka resultatet i det enskilda fallet, kan vi ej påtaga oss något ansvar för eventuella skadeverkningar.

ENDÅST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK: Läs medföljande anvisningar före användningen.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE: Mot örtgräs i odlingar av vete, korn, havre, råg och rågvete. Mot örtgräs i odlingar av gräsfvåll, betesvall och slåttervall. Betesdjur får inte släppas på behandlad mark tidigare än 7 dagar efter behandling.

All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Innehavare: Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 3H, DK-1411 Köpenhamn K, Danmark, tel. +45 45280800

Importör: Corteva Agriscience AB, Box 7199, SE-10388 Stockholm, www.corteva.se

Verksamma beståndsdelar: Fluroxipyr (1-metylheptylester) 144,1 g/l (14,53 % w/w). (motsvarar fluroxipyr 100 g/l). Florasulam 2,5 g/l (0,25 % (w/w)).

Innehåller: 1,2-Bensisotiazol-3(2H)-on, Lacknafta

Beredningsform: SE-Suspensionemulsion.

Lagring: Förvaras frostfritt och i tillsluten förpackning. Får inte förvaras i en temperatur som överstiger 40°C.

Tomemballage: Tom förpackning får inte återanvändas.


Satsnummer och tillverkningsdag: Se behållaren. Hållbar minst 2 år från tillverkningsdatum.



3 362130 078272 >

NETTOMÄNGD: 5 LITER e

™ Trademarks of Corteva
Agriscience and its
affiliated companies



0287381

2501

Blank area for in-house print of
2D data matrix code

Bruksanvisning

Starane XL är ett systemiskt medel för bekämpning av örtogräs i stråsäd, gräsfrö och slåtter- och betesvall. Produkten bekämpar bl.a. snärjmåra, baldersbrå, våtarv och korsblommigt ogräs. Starane XL får **inte** användas där blandningar innehållande klöver, lusern eller andra baljväxter har såtts. Betesdjur får inte släppas på behandlad mart tidigare än 7 dagar efter behandling. Endast en behandling per gröda och odlingssäsong.

Verkningsätt

Starane XL är en blandningsprodukt som är sammansatt av de aktiva beståndsdelarna florasulam, som är en ALS-hämmare, och fluroxipyr, som är en auxinalstrare.

Starane XL tas primärt upp via bladen. På känsliga ogräsarter kan man normalt se en effekt några dagar efter behandling upp till någon vecka efter behandling. Tillväxten stannar av och ogräsplantorna kommer att vissna ned inom loppet av 4 veckor.

Klimatförhållanden vid användning

Starane XL kan användas när temperaturen vid behandlingstillfället ligger över 5°C.

Starane XL är relativt oberoende av luftfuktigheten, d.v.s. produkten ger samma säkra effekt mitt på dagen som vid morgonsprutning.

Sprutning rekommenderas inte när grödan befinner sig i en stressituation p.g.a. torka, vattensjuk jord eller mycket hög dagstemperatur.

**Non-printed area on page 2 ONLY
(on the back of 2D code area printed
on the front page)**

Doserings- och användningstabell

| Gröda | BBCH | dosering l/ha | Effektnivå | | |
|----------------------------------------------------|-------|------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| | | | 95-100 % | 85-94,5 % | 70-84,9 % |
| Höstvete, höstkorn, höst råg och höstrågvete | 20-29 | 1,0 | Lomme, baldersbrå och våtarv | Pipdån, snärjmåra, åkerförgätmigej, kornvallmo, åkerrättika och svart nattskatta | Spillraps, blåklint, åkermolke och korsört |
| | 30-45 | 1,2 | Lomme, våtarv, blåklint, harkål och åkerbinda | Pipdån, snärjmåra, baldersbrå, kornvallmo, åkerrättika och svart nattskatta | Åkerförgätmigej, spillraps, åkermolke, åkersenap, näva och korsört* |
| Vårvete, vårkorn och havre | 13-19 | 0,36 | | baldersbrå, snärjmåra och åkersenap | Åkerbinda och vildpersilja |
| | 20-29 | 0,8 | Lomme, baldersbrå, snärjmåra och åkerpilört | Våtarv, trampört, vildpersilja, åkerrättika, åkerbinda och svart nattskatta | Pipdån, plister, åkermolke, och korsört |

| Gröda | BBCH | dosering l/ha | Effektnivå | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | | 95-100 % | 85-94,5 % | 70-84,9 % |
| Vårveete och vårkorn Havre | 30-45 | 1,0 | Våtarv och åkersenap | baldersbrå, snärjmåra, åker rättika, åkerbinda och svart nattskatta | åkermolke, plister och korsört |
| | 30-39 | | | | |
| Nyetablering av slåttervall, betesvall och gräströ till utsäde | 20-45 | 1,5 | Lomme, bergbräsma, baldersbrå, våtarv, korsört, blåklint, harkål, åkerbinda och svart nattskatta | Pipdån, snärjmåra, förgätmigej, näva, kornvallmo och åker rättika | Spillraps, åkermolke, svinmålla och maskros |
| Etablerad slåttervall, betesvall och gräströ till utsäde | 20-45 | 1,8 | Som ovan | Som ovan | Som ovan + vippskräppa |

* när ogräs är i hjärtbladsstadiet.

Jordart

Eftersom Starane XL primärt tas upp via bladen, kan den användas på alla jordtyper.

Regnfasthet

Starane XL tas snabbt upp via bladen och är regnfast efter en timme.

Tankblandningar

Starane XL är mycket flexibel som blandningspartner och kan blandas med de flesta ogräsmedel, svampbekämpningsmedel och tillväxtreglerande medel, dock bör Starane XL ej blandas med svampmedlet Armure1/ Tiro1. I höstkorn bör Starane XL ej blandas med svampmedel innehållande azoler.

Starane XL bör inte blandas med produkter som innehåller fenoxapro-p-petyl, där behandlingsintervallen skall vara 7 dagar.

Omsådd

Vid omsådd efter en Starane XL-behandling går det enbart att så stråsäd, majs eller rajgräs.

Efterföljande gröda

Efter en Starane XL-behandling finns det inga restriktioner för efterföljande gröda.

Observera!

Halm och växtmaterial, som har behandlats med Starane XL, bör inte användas i växthus eller till kompost. Se upp med vindavdrift mot känsliga grödor och i synnerhet till sättpotatis.

Rekommenderad skyddsutrustning vid användning

Vid beredning/rengöring: Använd halvmask, gasfilter A2 brun och partikelfilter P2, skyddsglasögon, överdragsbyxor, skyddshandskar och gummistövlar.

Vid sprutning: Med sprutbommen mindre än 1 meter över marken, monterad på traktorn eller liknande, samt när arbetet utförs utanför eller utan förarhytt används överdragsbyxor, skyddshandskar och gummistövlar. Vid sprutning med sluten hytt (ventilationsanläggning ska vara avstängd) ska det inte användas särskild skyddsutrustning. Vid annan appliceringsmetod hänvisas till Arbetsmiljöverkets broschyrer "Ditt grundskydd mot växtskyddsmedel".

Sprutteknik och vätskemängd

Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda

vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". Broschyren

finns på www.sakertvaxtskydd.se.

Starane XL skall appliceras med en växtskyddsspruta, som är kalibrerad och uppfyller de standarder och specifikationer som uppges av sprutillverkaren. Rekommenderad mängd vatten vid behandling med Starane XL är 100 till 300 liter vatten per hektar. För att säkerställa god nedträngning i täta grödor, rekommenderas låg hastighet (6-7 km/t) i kombination med hög vätskemängd (minst 200 l/ha).

Beredning av sprutvätska

Se alltid till att sprutan är ordentligt rengjord från rester och beläggningar samt kontrollerad före det att tillredning av sprutvätskan påbörjas. Detta gäller särskilt om sprutan har använts för sprutning i andra grödor. Sprutvätskan ska vara under omrörning vid tillredning fram till sprutningsarbetet är avslutat. Fyll halva behållaren med vatten och därefter tillförs önskad mängd preparat.

Preparatpåfyllare: Vid användning av preparatpåfyllare, fylls halva behållaren med vatten och därefter tillförs önskad mängd av preparat. Därefter sugs vätskan upp i sprutan samtidigt som rent vatten tillförs. Efteråt sköljs preparatpåfyllaren, och eventuellt tomt emballage. Upprepa processen med att öppna och stänga preparatpåfyllarens bottenventil tills inga synliga spår av preparatet finns.

Preparatdoserare: Vid användning av preparatdoserare hänvisas användaren till sprutillverkarens rekommendationer.

Invändig rengöring av sprututrustning vid avslutad/byte av sprutning

Observera! Eventuell sköljvattentank bör vara av sådan storlek att sprutvätskan kan utspädas minst 50 gånger. Var speciellt uppmärksam på att få rengjort alla invändiga detaljer grundligt. Aktivera alla slangar och ventiler samt öka trycket så att övertrycksventilen från det självrengörande filtret utlöser. Detta gäller under alla rengöringsprocesser.

- Starta med att tömma sprutan helt innan rengöring. Rester av sprutvätskan samt skölvattnet ska sprutas ut på den behandlade arealen.
- Genom de invändiga spolmunstyckena tvättas spruttanken invändigt, skölj även slangar och ramp strax efter sprutarbetets avslutning med rent vatten. Detta ska upprepas 2-3 gånger.
- Fyll vatten i tanken – 10-15% av tankkapaciteten (100-150 liter vatten i en 1000 liters tank) och tillsätt 0,5 liter All Clear2 Extra eller liknande produkt i rekommenderad dosering/ 100 liter vatten. Spruta lite av skölvattnet ut genom slangar, ramp och munstycke så de blötlägges. Låt tankspolmunstycke vara i drift under minst 15 minuter.
Töm därefter sprutan genom ramp och munstycken över tidigare besprutad areal under körning.
- Munstycke, filter och silar monteras av och tvättas i vatten, tillsätt 50 ml All Clear Extra/ 10 liter vatten.
- Skölj tanken och alla slangar grundligt i 5 minuter med rent vatten. Skölvattnet sprutas ut genom ramp och munstycke.

Utvändig rengöring av sprutor

Rengöring av spruta och traktor (sprutekipage) måste göras på det behandlade området, biobädd eller på en påfyllnings/tvättplats med uppsamling av tvättvatten i flytgödselbehållare eller annan behållare. Rengöring på det behandlade området kräver växtskyddsspruta försedd med tvättutrustning och att vattenkapaciteten är tillräcklig.

Resistensstrategi

| Produkt-namn | Typ | Verksam substans | HRAC grupp | Risk för utveckling av resistens |
|--------------|----------|------------------|------------|----------------------------------|
| Starane XL | Herbucid | Florasulam | 2 (B) | Hög |
| | | Fluroxipyr | 4 (O) | Låg |

Corteva Agriscience rekommenderar en stark anti-resistens strategi, efter riktlinjerna utarbetade av WRAG (Weed Resistance Action Group). För att undvika resistensutveckling rekommenderar Corteva Agriscience, att det generellt används ogräsmedel med olika verknings sätt i växtföljden. – gärna i blandningar. Det rekommenderas ytterligare att ha både vår och höstsådda grödor i växtföljden. Speciellt i samband med reducerad jordbearbetning bör dessa rekommendationer följas noggrant. Var medveten om att

bristande effekt (om produkten för övrigt har använts på rätt sätt) kan bero på begynnande resistensutveckling.

Lagring

Förvaras frostfritt och i tillsluten förpackning. Produkten får inte förvaras i en temperatur som överstiger 40°C.

Tomma emballage

Tom förpackning får inte återanvändas. De tomma flaskorna sköljs ordentligt med vatten minst tre gånger. Sköljvattnet häller man i sprutan. Väl rengjorda och torra plastförpackningar med avtagen skruvkork skall enligt överenskommelse lämnas för energiutvinning till SvegReturs insamlings- och återvinningssystem för plastförpackningar.

Observera att förpackningarna ska sköljas ordentligt minst 3 gånger och ställas upp och ned under minst 30 sekunder för avrinning. Företaget är anslutet till SvegReturs insamlings- och återvinningssystem för plastförpackningar (www.svepretur.se).

Corteva Agriscience AB er medlem av Svenskt Växtskydd.

¹Varumärke – Syngenta Crop Protection

²Varumärke - FMC Agricultural Solutions

**THIS PAGE HAS BEEN LEFT
INTENTIONALLY BLANK**

**THIS PAGE HAS BEEN LEFT
INTENTIONALLY BLANK**

Bekämpningsmedel klass 2L - Reg. nr 4686



Starane™ XL

OGRÄSMEDEL

GROUP 2 (B) HERBICIDE

GROUP 4 (O) HERBICIDE

UFI: GTGO-DODK-Y00U-DXM4

Detta medel är prövat i svenska försök. Anvisningarna grundar sig på resultaten från dessa. Då användningen ligger utanför vår kontroll och vi ej kan förutse alla de omständigheter som kan påverka resultatet i det enskilda fallet, kan vi ej påtaga oss något ansvar för eventuella skadeverkningar.

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK: Läs medföljande anvisningar före användningen.

ANVÄNDNINGSMOMRÅDE: Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, havre, råg och rågvete. Mot örtogräs i odlingar av gräsfrövall, betesvall och slättervall. Betesdjur får inte släppas på behandlad mark tidigare än 7 dagar efter behandling.

All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.

Innehavare: Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 3H, DK-1411 Köpenhamn K, Danmark, tel. +45 45280800

Importör: Corteva Agriscience AB, Box 7199, SE-10388 Stockholm, www.corteva.se

Verksamma beståndsdelar: Fluroxipyr (1-metylheptylester) 144,1 g/l (14,53 % w/w). (motsvarar fluroxipyr 100 g/l). Florasulam 2,5 g/l (0,25 % (w/w)).

Innehåller: 1,2-Bensisotiazol-3(2H)-on, Lacknafta

Beredningsform: SE-Suspensionemulsion.

Lagring: Förvaras frostfritt och i tisluten förpackning. Får inte förvaras i en temperatur som överstiger 40°C.

Tomemballage: Tom förpackning får inte återanvändas.

Satsnummer och tillverkningsdag: Se behållaren. Hållbar minst 2 år från tillverkningsdatum.



3 362130 078272 >

NETTOMÄNGD: 5 LITER e

™ Trademarks of Corteva
Agriscience and its
affiliated companies

0287381

2501



NO PRINT – GLUE PAGE